



Институт микробиологии
НАН Беларуси

Тел./факс: +375 17 267-47-66,
E-mail: microbio@mbio.bas-net.by,
www.mbio.bas-net.by

Ветеринарный препарат

БАЦИНИЛ-К

ТУ ВУ 100289066.088-2011, № гос.регистрации 3570-10-11 БППИ

Назначение: Бацинил-К предназначен для коррекции микробоценоза желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной системы при заболеваниях крупного рогатого скота, свиней и птицы.



Препарат обладает широким спектром действия против условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.

Препарат не угнетает нормофлору кишечника, обладает иммуностимулирующим действием, снижает заболеваемость энтеритом на 25-30%, уменьшает длительность болезни в 2 раза. Увеличивает прирост живой массы на 20%.

Экологические аспекты использования:

- не влияет на качество животноводческой продукции;
- безвреден и не требует применения специальных мер защиты животных и человека;
- позволяет получить экологически чистую продукцию

Рекомендации по применению:

Для профилактики энтеритов:

- цыплятам-бройлерам препарат выпаивают с питьевой водой из расчета 1 л препарата на 100 л воды, начиная с суточного возраста ежедневно в течение 5 дней в 2-3 цикла с интервалом 7-10 дней;
- новорожденным телятам в первый, третий дни жизни и при переводе из родильного отделения или в группы доращивания из расчета 10,0 см³ препарата на 100 см³ питьевой воды на голову;
- новорожденным пороссятам – в первый и третий дни жизни по 1,0 см³ на голову с питьевой водой, а в день отъема – 1,5 см³

Для лечения энтеритов:

- цыплятам-бройлерам препарат выпаивают с питьевой водой из расчета 2 л препарата на 100 л воды до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков болезни;
- телятам с признаками энтеритов по 15,0 см³ на голову в день с питьевой водой из расчета 1 лечебная доза на 100 см³ воды ежедневно до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков болезни;
- пороссятам с признаками энтеритов по 1,5 см³ в день с питьевой водой из расчета 1 лечебная доза на 20 см³ воды на голову ежедневно до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков болезни.

Допускается применение препарата Бацинил-К в комплексе с симптоматическими и антибактериальными средствами. Для профилактики и терапии энтеритов у новорожденных животных допускается его применение с молоком или молозивом.

Противопоказаний и побочных действий для препарата Бацинил-К не выявлено.

Применение препарата не влияет на качество животноводческой продукции, которая используется без ограничений.

Бацинил-К безвреден и не требует применения специальных мер предосторожности.

Действующее начало препарата: клетки, споры, продукты метаболизма бактерий *Bacillus subtilis*

Препаративная форма: жидкость

Срок хранения: 6 месяцев при температуре от +4°C до +15°C.